



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
 AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
 AREA FARMACI E DISPOSITIVI
 AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Direttori Generali e Commissari Straordinari
 ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici
 Universitari, IRCCS del Lazio.

Direttori Sanitari
 ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici
 Universitari, IRCCS del Lazio.

Dipartimenti di Prevenzione
 Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
 ASL del Lazio

Responsabili dei servizi Vaccinali
 delle ASL del Lazio

MMG/PLS

FEDERFARMA
 ASSOFARM
 FARMACAP

e p.c. LazioCrea
 ARES 118

Oggetto: aggiornamento delle indicazioni sull'utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti.

Facendo seguito alla circolare del Ministero della Salute n. 0038309 del 07/09/2022, con la quale venivano fornite indicazioni relative alla disponibilità e utilizzo dei vaccini a m-RNA nella formulazione bivalente *Original/Omicron BA.1*, si trasmette la circolare del Ministero della Salute n. 0040319 del 23/09/2022, e relativi allegati, con la quale vengono aggiornate tali indicazioni.

Come specificato nella nota congiunta di Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS, a seguito dell'autorizzazione da parte di EMA e AIFA della formulazione bivalente Original/BA.4-5 del vaccino Comirnaty, sono ora disponibili, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARSCoV-2/COVID-19, due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA:

- original/omicron BA.1 di Spikevax e original/omicron BA.1 di Comirnaty
- original/BA.4-5 di Comirnaty

Non ci sono evidenze per stabilire un uso preferenziale di uno dei tre vaccini disponibili.

Pertanto le precedenti indicazioni sull'utilizzo della formulazione original/omicron BA.1 vengono estese anche alla formulazione original/BA.4-5 senza alcuna distinzione.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
AREA FARMACI E DISPOSITIVI
AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Nello specifico si raccomanda prioritariamente l'utilizzo delle formulazioni di vaccini a m-RNA bivalenti:

- come **seconda dose di richiamo** a favore di tutte le persone di età ≥ 60 anni, delle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età ≥ 12 anni (allegato 1 della nota MdS-AIFA-ISS), degli operatori sanitari, degli ospiti e operatori delle strutture residenziali e delle donne in gravidanza, nelle modalità e tempistiche previste per la stessa;

- come **seconda dose di richiamo**, dietro valutazione e giudizio clinico specialistico, ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto emopoietico o di organo solido (allegato 2 della nota MdS-AIFA-ISS), che hanno già ricevuto un ciclo primario di tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall'ultima dose) e una successiva prima dose di richiamo;

- come **prima dose di richiamo**, nelle modalità e tempistiche previste per la stessa, a favore dei soggetti di età ≥ 12 anni che non l'abbiano ancora ricevuta, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario.

Tali vaccini, tenuto conto dell'indicazione di utilizzo autorizzata da EMA e AIFA, potranno, comunque, essere resi disponibili su richiesta dell'interessato, come seconda dose di richiamo, per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo.

La somministrazione della prima o seconda dose di richiamo sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni dall'ultima vaccinazione effettuata o dall'ultima infezione (data del test diagnostico positivo).

L'accesso alla somministrazione del vaccino può avvenire tramite:

- **medico di famiglia;**
- presso le **farmacie;**
- **prenotazione on line** presso i punti di somministrazione vaccinale attraverso la piattaforma regionale al link: <https://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19>
- presso i **Centri sanitari della Regione Lazio** presso cui i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria sono in cura.

La piattaforma è stata aggiornata in ordine alla tipologia di vaccino somministrato ed al materiale informativo.

Per le richieste di vaccinazione a domicilio, è possibile contattare il numero verde 800118800.



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
AREA FARMACI E DISPOSITIVI
AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Si ribadisce, come già indicato nelle precedenti comunicazioni ministeriali e regionali, l'importanza di assicurare la vaccinazione a tutti i soggetti che non hanno ancora effettuato/completato il ciclo di vaccinazione primaria, da effettuarsi con il vaccino tradizionale.

Si sollecitano pertanto le Direzioni Aziendali a pianificare e implementare l'offerta della vaccinazione coinvolgendo anche i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

Cordiali Saluti

Il Dirigente dell'Area Promozione della Salute e Prevenzione

Alessandra Barca

Il Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi

Lorella Lombardozzi

Il Dirigente dell'Area Sistemi Informativi/Ict,
Logistica Sanitaria E Coordinamento Acquisti

Daniela Fusco

IL DIRETTORE
Massima Annicchiarico

In allegato:

- Circ. Ministero della Salute n. 40319_23-09-2022 - aggiornamento delle indicazioni sull'utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti
- Nota MdS-AIFA-ISS (Allegato 1) aggiornamento indicazioni utilizzo vaccini a m-RNA bivalenti
- Allegati 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.

Laura Alecci
lalecci@regione.lazio.it

VIA R. R. GARIBALDI, 7
00145 ROMA

WWW.REGIONE.LAZIO.IT

prevenzionepromozionesalute@regione.lazio.legalmail.it